

# الأسبرين يقلل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا القاتل



السبت 4 مارس 2017 04:03 م

وقالت الطبيبة ماري كيه داوونر من كلية (هارفارد تي أتش تشان للصحة العامة) في بوسطن "يبدو أن هناك صلة أقوى بين الاستخدام المنتظم للأسبرين وتقلص خطر الإصابة بسرطان البروستاتا القاتل في مراحل متأخرة من تقدم السرطان".

وأضافت أن ذلك يعني أن "الأسبرين قد يمنع انتشار الورم الخبيث إلى أعضاء أخرى وليس بدء الورم، وهو ما يمكن القول إنه أكثر أهمية من الناحية العلاجية".

وفي حين لا توجد معلومات مؤكدة حول صلة استخدام الأسبرين وسرطان البروستاتا القاتل، فإن دراسات سابقة قدمت نتائج متضاربة بشأن الصلة بين تناول الأسبرين بشكل منتظم وسرطان البروستاتا بشكل عام.

واستخدم فريق الطبيبة داوونر بيانات من أكثر من 22 ألف مشارك في دراسة "فيزيكانز هيلث" للبحث عن الصلة المحتملة بين استخدام الأسبرين بشكل منتظم (أكثر من ثلاثة أيام أسبوعياً لمدة عام على الأقل) وسرطان البروستاتا القاتل.

وقالت داوونر إن الأدلة على وجود صلة بين الأسبرين والبدء الفعلي لأورام سرطان البروستاتا متأرجحة "ونتناجنا تشير لعدم وجود صلة بين الاستخدام المنتظم للأسبرين وحدوث سرطان البروستاتا بالمجمل".

وأضافت "التساؤل الأكثر أهمية هو ما إذا كان الأسبرين يمنع تقدم سرطان البروستاتا إلى مرض مؤذ (ينتشر بالجسم أو يصبح قاتلاً)". وأضافت "بينما تشير نتائجنا إلى أنه ربما يقوم بذلك، فإنه ينبغي ألا تؤثر هذه النتائج على خطط العلاج لمرضى سرطان البروستاتا وإنما يجب أن تستخدم نتائجنا لتوجيه البحث في المستقبل في هذا المجال".

وقالت الباحثة "إن فريق خدمات العمل الوقائي في الولايات المتحدة يوصي باستخدام الأسبرين للرجال والنساء بالفئة من 55 إلى 79 بسبب التأثير الوقائي المحتمل ضد احتشاء عضلة القلب، وهناك دراسات أخرى عديدة تشير إلى أن الأسبرين ربما يقلل من مخاطر أنواع أخرى من السرطان".