

- [f](#)
- [t](#)
- [a](#)
- [v](#)
- [i](#)
- [s](#)

الأحد ٧ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ - 20 سبتمبر 2026 م

أخبار النافذة

[أدوية إنقاص الوزن تثير مخاوف من هذا الخطر أثناء الجراحة](#) [ديريي مدريد وكلاسكو فرنسا يرفعان حرارة الأحد الكروي في ملاعب أوروبا](#) [تأخر الصرف الصحي في دار السلام بسوهاج يحاصر الأهالي بالتلوث ويهدد تشغيل المستشفى حتى 2028](#) [تكييف السيارة القاتل الصامت..كيف يحدث الاختناق المفاجيء بالغازات؟ الفضول والتطور والسيطرة على قائمة مهامك: لماذا يجب أن تركز على التحسين أكثر من الفوز؟ قد لا تشفى منه أبدًا.. الفيلم الذي أصاب إسرائيل في أخطر ما لديها الاحتجاجات السورية واختبار الدولة الجديدة لا للمعلبات والقوالب الحامدة](#)

□

Submit

Submit

- [الرئيسية](#)
- [الأخبار](#)
 - [اخبار مصر](#)
 - [اخبار عالمية](#)
 - [اخبار عربية](#)
 - [اخبار فلسطين](#)
 - [اخبار المحافظات](#)
 - [منوعات](#)
 - [اقتصاد](#)
- [المقالات](#)
- [تقارير](#)
- [الرياضة](#)
- [تراث](#)
- [حقوق وحريات](#)
- [التكنولوجيا](#)
- [المزيد](#)
 - [دعوة](#)
 - [التمنية البشرية](#)
 - [الأسرة](#)
 - [مديا](#)

[الرئيسية](#) « [الأخبار](#) » [منوعات](#)

أدوية إنقاص الوزن تثير مخاوف من هذا الخطر أثناء الجراحة





الأحد 20 سبتمبر 2026 09:30 م

كشفت دراسة بريطانية حديثة عن وجود ارتباط بين استخدام أدوية إنقاص الوزن من فئة GLP-1، ومن بينها «مونجارو» و«يغوفي»، وارتفاع احتمالات التعرض لمضاعفات تنفسية خطيرة خلال العمليات الجراحية التي تُجرى تحت التخدير العام.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن المرضى الذين يستخدمون هذه الأدوية قد يكونون أكثر عرضة بنحو 11 مرة للإصابة بالارتجاع المعدي أو ما يعرف بـ«الشفط الرئوي»، مقارنة بغير المستخدمين، ويرتبط ذلك بتأثير هذه العقاقير في إبطاء عملية إفراغ المعدة، ما قد يؤدي إلى بقاء محتوياتها لفترة أطول رغم الالتزام بتعليمات الصيام قبل الجراحة.

واعتمد الباحثون من مؤسسة «جايز آند سانت توماس» وكلية كينغز لندن على بيانات 47039 مريضًا خضعوا لإجراءات طبية في 119 مستشفى داخل المملكة المتحدة.

وأظهرت البيانات تسجيل مضاعفات لدى نحو 1.4% من المرضى الذين كانوا يستخدمون أدوية GLP-1، مقابل 0.12% بين المرضى الذين لم يتناولوا هذه العقاقير.

ورغم الفارق الكبير في معدل الخطر النسبي، أوضح الباحثون أن الاحتمال الإجمالي لحدوث هذه المضاعفات لا يزال منخفضًا، مشيرين إلى أن السمنة ومرض السكري يمثلان في حد ذاتهما عاملين مستقلين قد يزيدان مخاطر المضاعفات أثناء الجراحة، وهو ما يجعل تحديد تأثير الدواء وحده أمرًا غير محسوم.

اختلاف حول إيقاف الدواء

ولا تزال التوصيات الطبية بشأن التعامل مع أدوية GLP-1 قبل العمليات الجراحية محل اختلاف، إذ يرى بعض الأطباء ضرورة التوقف عن استخدامها لمدة أسبوعين قبل الجراحة.

في المقابل، تشير الإرشادات الرسمية المعمول بها في المملكة المتحدة إلى الاستمرار في تناول العلاج، في ظل عدم توافر أدلة كافية تثبت أن إيقافه مؤقتًا يقلل مخاطر المضاعفات، خصوصًا لدى المرضى المصابين بمرض السكري.

وتسلط نتائج الدراسة الضوء على الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد أفضل طريقة للتعامل مع هذه الأدوية قبل الخضوع للتخدير العام، مع مراعاة الحالة الصحية لكل مريض والمخاطر المرتبطة بالسمنة والسكري.

المصدر: ديلي ميل



[فضيحة... مسئولون باتحاد الملاكمة يطلبون 81 ألف جنيه من عمرو خالد و90 ألفا من حسام حسن مقابل المشاركة بأولمبياد البحر المتوسط](#)

الخميس 16 يوليو 2026 01:00 م

[ميديا](#)



[خصم 50% على مونوريل شرق النيل يكشف أزمة التسعير وضعف إقبال محدودي الدخل](#)
الجمعة 22 مايو 2026 06:30 م

مقالات متعلقة

[عجائز لا وعاكذلاو داعسلا لكحمنة عيحابص تاداء 9 ..ةهجالولا دوعي تادجلا نيكتور](#)

[بروتين الجذات يعود للواجهة.. 9 عادات صاحبة تمنحك السعادة والذكاء والإنتاجية](#)
لا فطلا تانومره يلاء رثوة م لأاب يلاحي في فيثايميك دالوم فاشتكا ..رطاخ سوقا

[ناقوس خطر.. اكتشاف مواد كيميائية في حليب الأم تؤثر على هرمونات الأطفال](#)
عوقو عافص رةكا أموي عنصة قطيسر داء ..ركابلا حا بصلاي في طاقيتسلاو ركبملا مونا

[النوم المبكر والاستيقاظ في الصباح الباكر.. عادة بسيطة تصنع يوماً أكثر صفاءً وقوة](#)
وبرلاو لصافملا باهتلاي لإيقلخلا بويعلانم اعد ..ةحصلاب رصة فيلزنملا فيبطنلا تاجنم

[منتجات التنظيف المنزلية تضر بالصحة.. بدءاً من العيوب الخلقية إلى التهاب المفاصل والربو](#)

- [التكنولوجيا](#)
- [دعوة](#)
- [التنمية البشرية](#)
- [الأسرة](#)
- [ميديا](#)

- [الأخبار](#)
- [المقالات](#)
- [تقارير](#)
- [الرياضة](#)
- [تراث](#)
- [حقوق وحريات](#)

□

- 
- 
- 
- 
- 
- 

ادخل بريدك الإلكتروني

إشترك

جميع الحقوق محفوظة لموقع نافذة مصر © 2026